YouTube Francesco Pastore

Dott. Francesco Pastore
cell. +39 338 9451132
francesco.pastore60@tin.it
SIMBA - Manovre per la vita

# LATTANTE COSCIENTE

## OSTRUZIONE TOTALE

- *Non piange*
- *Non tossisce*
- *Non parla e non emette alcun suono*

## Manovre di disostruzione delle vie aeree

Lattante

NON SCUOTERE IL LATTANTE NON METTERLO A TESTA IN GIÙ' NON METTERE IL DITO IN BOCCA

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI ILCOR 2015

112 Numero Unico Emergenza

**1** Nel momento in cui ci rendiamo conto che il lattante non respira, non piange, non tossisce e cambia colore, la prima cosa da fare è allertare i sistemi medici di emergenza, chiamando il numero 118 o 112.

**2** Con la mano assicurare il capo del lattante fissando la mandibola tra il pollice e indice posizionati a "C".

## (0 - 1 anno) LATTANTE

**3** Disporre il lattante prono (pancia in giù) sull'avambraccio.
Posizionare a sua volta l'avambraccio sulla coscia dello stesso lato, per garantire la stabilità e far si che le manovre siano efficaci, facendo attenzione a non iperestendere il capo del lattante.
Effettuare subito 5 pacche interscapolari avendo cura di non colpire il capo.

**5** Girare il lattante sull'altro avambraccio, sempre in posizione declive, assicurandolo sul piano rigido formato da avambraccio e coscia.

**6** Posizionare perpendicolarmente l'indice ed il medio al di sotto dello sterno, subito sotto la linea immaginaria che collega i capezzoli del lattante ed eseguire 5 compressioni toraciche lente e profonde.

Alternare le 5 pacche interscapolari alle 5 compressioni toraciche fino a quando l'ostruzione non si risolve o il lattante diventi INCOSCIENTE: in questo caso si inizia il protocollo di rianimazione cardiopolmonare che si può imparare nei corsi certificativi BLSD/PBLSD o PBLS. Nell' OSTRUZIONE PARZIALE evitare qualsiasi manovra di disostruzione e favorire la tosse.

Graphic Design Project
Arch. Rita Boccuni